

Rådgivningsstödet webb


Metis Forum 31 maj 2017



Nationellt sammanhang

1177.se

7,5–8 miljoner
besök per
månad



1177
Vårdguiden
på telefon

400 000 samtal
per månad

E-tjänster

1,8 miljoner inloggningar
per månad

1177 VÅRDGUIDEN Rådgivningsstödet

Startsida Index Länkar Utbildning Om webbplatsen

Sök i medicinskt innehåll: SÖK

Krampanfall

Vägledande vid bedömning av kramper är hur länge anfallet varat, allmäntillståndet efteråt och hur ofta krampanfallen kommer. Annat att ta hänsyn till är om det är första gången man får ett krampanfall.

Omgående

- > Krampanfall som inte upphör
- > Upprepade krampanfall utan att medvetandet återfås mellan dem
- > Påverkat allmäntillstånd efter ett krampanfall

Skyndsamt

- > Krampanfall för första gången
- > Spädbarn som får serier av kramper
- > Upprepade feberkramper samma dygn

Närmaste dygnet

- > Frånvaroattak för första gången
- > Känd krampsjukdom som ändrat karaktär

Vardag närmaste tiden

- > Känd krampsjukdom med anfall trots behandling
- > Känd affektkramp med kramper flera dagar i rad

Avvakta

- > Enstaka igenkänd feberkramp
- > Igenkänd affektkramp

Påverkat allmäntillstånd

- Barn
- Spädbarn
- Vuxen

Sjukdomar och skador

- Affektanfall hos barn
- Alkoholberoende
- Epilepsi
- Feberkramper hos barn
- Kramper hos barn

Råd

- Feber hos barn

1177.se

Om ett barn, som vid ett tidigare tillfälle haft en feberkramp, får upprepade feberkramper under samma dygn bör barnet bedömas.

Sökfält

Titel

Inledande text

Symtomrader

Relaterad information

Läs mer-text

Brådskegrader

- Anslutningsläget RGS webb Sjunet
- Kunder RGS webb Internet
- Finansiering
- Utmaningar

Sammanfattning

Rådgivningsstödet Webb

- har samma medicinska innehåll som det rådgivningsstöd landstingen och regionerna använder för sjukvårdsrådgivning
- är samstämmigt med 1177.se
- underlättar en likvärdig vård i hela landet